

Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España
Protocolos Clínicos Aceptados

PROCOLO DE
SEGURIDAD HEMOSTÁSICA DE LOS PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS
EN PACIENTES TRATADOS CON ANTICOAGULANTES

El presente Protocolo Clínico Aceptado por el Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, titulado “Protocolo de seguridad odontológica en pacientes tratados con anticoagulantes” sólo persigue un fin informativo y tiene carácter meramente orientativo, por lo que su aplicación es voluntaria, al mejor criterio del facultativo.

Codificación:

Los procedimientos recogidos en letra redonda son siempre seguros

Los procedimientos destacados en *cursiva* revisten riesgo de sangrado en pacientes anticoagulados.

Los procedimientos destacados en ***negrita cursiva*** no deben ser practicados en pacientes anticoagulados sin un previo ajuste del tratamiento anticoagulante por el hematólogo

Los procedimientos inscritos en **VERSALITA NEGRITA** no deben realizarse en régimen ambulatorio, debiendo practicarse previo ingreso hospitalario.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD HEMOSTÁSICA DE LOS PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS EN PACIENTES ANTICOAGULADOS

| PROCEDIMIENTO | RIN (Ratio Internacional Normalizado) ¹ INR (International Normalized Ratio) | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|---|---|
| | Valor necesario para intervenciones quirúrgicas electivas: ≤ 2 | | | | |
| | Inferior al rango terapéutico de anticoagulación | | Dentro del rango terapéutico anticoagulante | | |
| | > 1,5 | 1,5-2 | 2-2,5 | 2,5-3 | >3 |
| Examen | Procedimiento seguro | Procedimiento Seguro | Procedimiento Seguro | Procedimiento Seguro | Procedimiento seguro |
| Radiografías | | | | | |
| Toma de impresiones | | | | | |
| Profilaxis supragingival | Procedimiento Seguro | Procedimiento Seguro | Procedimiento Seguro | Procedimiento Seguro | Procedimiento seguro |
| Obturaciones | | | | | |
| Reconstrucciones complejas | | | | | |
| Conductoterapias | | | | | |
| Tallados coronarios | | | | | |
| Exodoncias simples | Procedimiento Seguro | Procedimiento Seguro | Procedimiento seguro | Usar | Usar |
| Curetajes gingivales | | | | medidas locales | medidas locales |
| Gingivoplastias | | | | | |
| Exodoncias múltiples simples de un cuadrante | Procedimiento Seguro | Procedimiento seguro | Usar | Usar | Usar |
| Exodoncia diente incluido | Procedimiento probablemente seguro | Procedimiento probablemente seguro | Procedimiento probablemente seguro | Procedimiento inseguro: enviar a hematólogo | Procedimiento inseguro: enviar a hematólogo |
| Gingivectomía | | | | | |
| Cirugía periodontal | | | | | |
| Apicectomía | | | | | |
| Colocación de implante | | | | | |
| Cirugía de colgajos amplios | Procedimiento probablemente seguro | Procedimiento probablemente seguro | Procedimiento inseguro: enviar a hematólogo | Procedimiento inseguro: enviar a hematólogo | Procedimiento inseguro: enviar a hematólogo |
| Extracción múltiple de dientes incluidos | | | | | |
| Colocación de múltiples fijaciones | | | | | |
| Edentulación completa de una arcada | Procedimiento probablemente seguro | Usar medidas locales | Procedimiento inseguro: enviar a hematólogo | Procedimiento inseguro: enviar a hematólogo | Procedimiento inseguro: enviar a hematólogo |
| Edentulación completa simultánea de ambas arcadas | | | | | |
| REDUCCIÓN DE FRACTURAS ABIERTAS | PROCEDIMIENTO HOSPITALARIO | PROCEDIMIENTO HOSPITALARIO | PROCEDIMIENTO HOSPITALARIO | PROCEDIMIENTO HOSPITALARIO | PROCEDIMIENTO HOSPITALARIO |
| CIRUGÍA ORTOGNÁTICA | | | | | |

¹ El RIN es el cociente entre el tiempo de protrombina del paciente y el tiempo de un laboratorio estándar o de referencia. Es el inverso de la tasa de protrombina.